


Våra nuvarande arbetssätt
i förhållande till
de nya nationella riktlinjerna

- en GAP-analys



Hur har vi gjort analysen?

- Digital enkät med ett trettiotal frågor kring utvalda riktlinjer
- Framtagen av Socialstyrelsen och NPO Tandvård
- Pilottestad hos 39 tandläkare och tandhygienister
- Utskick per mail till ALLA tandläkare och tandhygienister i Sverige - unikt
- En påminnelse per email
- Ligger till grund för GAP – analys
- Utvärderar våra nuvarande arbetssätt i förhållande till rekommendationerna i de nya nationella riktlinjerna.
- Data finns uppdelad mellan yrkeskategori, region, offentlig/privat

	Hela landet	SÖSR
Antal respondenter	2893	384
Andel tandläkare (antal)	57% (1649)	56% (215)
Andel tandhygienister (antal)	41% (1186)	44% (169)
Klinikstorlek (>10 personer)	77%	73%
Tid i yrket (>15 år)	51%	57%
Offentlig verksamhet (antal)	83% (2401)	83% (319)
Privat verksamhet	17% ((491)	17% (65)
Verksam i allmäntandvård	79%	75%
Verksam i specialisttandvård	16%	21%
Verksam i allmän- och specialisttandvård	5%	4%

Hur många är vi i SÖSR?

T-hyg 452 och Tdl 728 Svarsfrekvens enkät: 32,5%

**Hälso- och sjukvårdspersonal, Sysselsatta inom hälso- och sjukvård, Alla näringsgrenar, Ålder: -
, Båda könen, 2019**

Grupp	Område	Regi	2019		
Tandhygienist	Östergötlands län	Offentlig regi	102		
Tandhygienist	Östergötlands län	Privat regi	75		
Tandhygienist	Jönköpings län	Offentlig regi	115		
Tandhygienist	Jönköpings län	Privat regi	71		
Tandhygienist	Kalmar län	Offentlig regi	61		
Tandhygienist	Kalmar län	Privat regi	28		
Tandläkare	Östergötlands län	Offentlig regi	157		
Tandläkare	Östergötlands län	Privat regi	136		
Tandläkare	Jönköpings län	Offentlig regi	176		
Tandläkare	Jönköpings län	Privat regi	87		
Tandläkare	Kalmar län	Offentlig regi	114		
Tandläkare	Kalmar län	Privat regi	58		
Socialstyrelsens statistikdatabas 2021-11-05					

Vilka har vi svarat?

T-hyg 452 och Tdl 728 Svarsfrekvens enkät: 32,5%

	Offentlig verksamhet	Privat verksamhet
Tandläkare	36%	17%
Tandhygienister	55%	10%
Totalt	32%	

Hur vi presenterar gapen i analysen

Kopplingar görs mellan vissa rekommendationer i NR och svar från aktuella frågor i enkäten




Data presenteras utifrån hela riket eller sydöstra sjukvårdsregionen samt med uppdelning mellan privat och offentlig tandvård.



En tolkning görs ur vårt SSÖR perspektiv. Vad gör vi redan och var behöver följsamheten förbättras?

De nya nationella riktlinjerna för tandvård är här och nu startar implementeringsarbetet för oss i tandvården!

De nya nationella riktlinjerna för tandvård är här och nu startar implementeringsarbetet för oss i tandvården i SÖSR



Fissurförseglingar


-generell profylax eller behandling i undantagsfall?

Rekommendationer till tandvården – främja barns munhälsa

Id	Främja <u>endast i undantagsfall</u> munhälsan hos barn som ...	genom att utföra ...	Prioritet
42	nyss har börjat få permanenta molarer (kindtänder), som är kariesfria	fissurförsegling av ocklusalytan (en utfyllning av tuggytan), för att förebygga karies	9

Fissurförseglingar

-generell profylax eller behandling i undantagsfall?



Rådgivning till patienter med ohälsosamma levnadsvanor



Tobak och alkohol



Rekommendationer till tandvården – främja munhälsan hos personer med ohälsosamma levnadsvanor

Id	Främja munhälsan hos barn som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
10	använder tobak	kvalificerat rådgivande samtal	3*
6, 8	<ul style="list-style-type: none">• är 2–12 år och• har ohälsosamma matvanor eller är otillräckligt fysiskt aktiva**	familjestödsprogram	5*
Id	Främja munhälsan hos vuxna som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
99	<ul style="list-style-type: none">• ska opereras i munnen och• röker	<ul style="list-style-type: none">• kvalificerat rådgivande samtal och• nikotinläkemedel	1*
5, 9	<ul style="list-style-type: none">• har ohälsosamma matvanor eller• röker dagligen	kvalificerat rådgivande samtal	2*
100	<ul style="list-style-type: none">• ska opereras i munnen och• har ett riskbruk av alkohol	rådgivande samtal	3*
3	<ul style="list-style-type: none">• har en sjukdom i vävnader kring tänder eller tandimplantat och• har otillräcklig munhygien	kvalificerat rådgivande samtal	5
4		rådgivande samtal	6
101	snusar dagligen	rådgivande samtal	6*
7	har ohälsosamma matvanor		7*

Erbjuder du stöd till vuxna patienter med följande ohälsosamma levnadsvanor?

Id	Främja munhälsan hos vuxna som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
5, 9	<ul style="list-style-type: none">• har ohälsosamma matvanor eller• röker dagligen	kvalificerat rådgivande samtal	2*


Alltid/Ofta	Hela riket	Sydöstra
Ohälsosamma matvanor	56%	53%
Rökning	48%	52%

Vilken typ av stöd erbjuder du patienter ohälsosamma levnadsvanor?

Id	Främja munhälsan hos vuxna som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
99	<ul style="list-style-type: none"> • ska opereras i munnen och • röker 	<ul style="list-style-type: none"> • kvalificerat rådgivande samtal och • nikotinläkemedel 	1*
5, 9	<ul style="list-style-type: none"> • har ohälsosamma matvanor eller • röker dagligen 	kvalificerat rådgivande samtal	2*

	Hela riket		Sydöstra	
	Matvana	Rökning	Matvana	Rökning
Rådgivande samtal	92%	78%	94%	74%
Kvalificerat rådgivande samtal	12%	10%	10%	14%
Remiss inom organisationen	11%	10%	6%	21%*
Remiss utom organisationen (tex VC)	10%	35%	9%	29%

Vilken typ av stöd erbjuder du patienter som röker?



FTV Östergötland har rökavvänjning i sitt folkhälsoupdrag och utbildade rökavvänjare inom organisationen

Hur ofta frågar du patienter som ska genomgå en operation i munnen om de har följande ohälsosamma levnadsvanor?

Id	Främja munhälsan hos vuxna som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
99	<ul style="list-style-type: none"> • ska opereras i munnen och • röker 	<ul style="list-style-type: none"> • kvalificerat rådgivande samtal och • nikotinläkemedel 	1*
100	<ul style="list-style-type: none"> • ska opereras i munnen och • har ett riskbruk av alkohol 	rådgivande samtal	3*

Alltid/Ofta	Hela riket	Sydöstra
Rökning	90%	89%
Riskbruk av alkohol	20%	20%
Frågar Sällan el Aldrig om alkohol	63%	73%

Erbjuder du stöd till vuxna patienter med följande ohälsosamma levnadsvanor som ska opereras i munnen?

Id	Främja munhälsan hos vuxna som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
99	<ul style="list-style-type: none"> • ska opereras i munnen och • röker 	<ul style="list-style-type: none"> • kvalificerat rådgivande samtal och • nikotinläkemedel 	1*
5, 9	<ul style="list-style-type: none"> • har ohälsosamma matvanor eller • röker dagligen 	kvalificerat rådgivande samtal	2*

Alltid/Ofta	Hela riket	Sydöstra
Rökning	45%	45%
Riskbruk Alkohol	16%	14%

Vilken typ av stöd erbjuder du patienter som ska genomgå en operation i munnen?

Id	Främja munhälsan hos vuxna som ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
99	<ul style="list-style-type: none"> • ska opereras i munnen och • röker 	<ul style="list-style-type: none"> • kvalificerat rådgivande samtal och • nikotinläkemedel 	1*
5, 9	<ul style="list-style-type: none"> • har ohälsosamma matvanor eller • röker dagligen 	kvalificerat rådgivande samtal	2*

	Hela riket		Sydöstra	
	Rökning	Alkohol	Rökning	Alkohol
Rådgivande samtal	81%	78%	76%	70%
Kvalificerat rådgivande samtal	12%	9%	13%	12%
Remiss inom organisationen	10%	8%	23%	10%
Remiss utom organisationen (tex VC)	33%	32%	27%	32%

Rådgivande samtal och Kvalificerat rådgivande samtal

Stöd för att ändra ohälsosamma levnadsvanor: rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal

Rådgivande samtal och **kvalificerat rådgivande samtal** ger patienter stöd för att själva vilja och kunna ändra ohälsosamma levnadsvanor. Båda metoderna innebär att tandvårdspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal för en personcentrerad dialog med patienten, anpassad till ålder, hälsa, risk för ohälsa med mera. Patienten görs mycket delaktig i processen mot ett nytt beteende. Samtalen kan inkludera motiverande strategier, och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel. Även information och råd om egenvård ingår.

Ett rådgivande samtal tar vanligtvis 5–15 minuter, medan ett kvalificerat rådgivande samtal ofta tar längre tid och alltid följs upp. Kvalificerat rådgivande samtal är också en teoribaserad och strukturerad åtgärd, till skillnad från enbart rådgivande samtal. Det betyder att åtgärden bygger på vissa tydliggjorda antaganden om hur och varför den fungerar, och innehåller vissa fördefinierade komponenter.* Åtgärden kräver fördjupad ämneskunskap och utbildning i den teori och metod som samtalet bygger på.

*Socialstyrelsen har dock inte tagit ställning till specifika teorier om beteendeförändringar, eftersom det inte finns tillräckligt med underlag för att dra slutsatser om vilken teori som ger bäst effekt. Ofta inkluderar dessutom ett kvalificerat rådgivande samtal komponenter från flera olika teorier. Se exempel i webbilagan *Kunskapsunderlag*.

Utbildningsbehov

- En låg andel av de svarande har angivit att kvalificerat rådgivande samtal är det stöd man ger patienter med ohälsosamma levnadsvanor (prioritet 2).
- En tolkning av resultatet är att många svarande inte gör skillnad på rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.
- Sannolikt föreligger därutöver ett stort utbildningsbehov för både tandläkare och tandhygienister vad gäller metoder som används för stöd till beteendeförändring.



Klorhexidin


När du undersöker vuxna som behöver särskilt stöd (exempelvis sköra, äldre patienter), hur ofta ger du råd om daglig tillförsel av klorhexidinpreparat?

Rekommendationer till tandvården – främja munhälsan hos vuxna som behöver särskilt stöd

	munhälsan hos vuxna som behöver särskilt stöd och ...		
88	<ul style="list-style-type: none">• har karies eller bedöms riskera att få det eller• har gingivit eller bedöms riskera att få det	behandla med klorhexidinpreparat, dagligen	10

Klorhexidin

Frekvensfördelning för olika användningsgrad




Systematisk registrering

Hörntänder, Erosioner, TMD

Rekommendationer till tandvården – systematiska arbetssätt

Id	Arbeta systematiskt för personer som ...	genom att ...	Prioritet
1, 24	besöker tandvården för undersökning	<ul style="list-style-type: none">• bedöma risken för sjukdomar och andra tillstånd i munnen, och utreda orsaker vid behov och• registrera erosioner (tandskador) med hjälp av ett erosionsindex	3
2	har en sjukdom i munnen eller bedöms riskera att få det	behandla orsaken till sjukdomen, inte enbart symtomen	3
E35	<ul style="list-style-type: none">• är över 12 år och• besöker tandvården för undersökning	upptäcka smärta och funktionsstörningar i käkarna	3
E36	<ul style="list-style-type: none">• är över 12 år och• har smärta och funktionsstörningar i käkarna	ställa diagnos i systemet DC/TMD	3
72	<ul style="list-style-type: none">• är 9–13 år	diagnostisera störningar i hörntändernas framväxt (eruptionsstörningar)	3



Systematisk registrering Hörntänder

Id	Arbeta systematiskt för personer som ...	genom att ...	Prioritet
72	<ul style="list-style-type: none">är 9–13 år	diagnostisera störningar i hörntändernas framväxt (eruptionsstörningar)	3

	Hela riket	Sydöstra	Tandläkare
Alltid/Ofta	90%	87%	92%

Systematisk registrering Erosioner

Id	Arbeta systematiskt för personer som ...	genom att ...	Prioritet
1, 24	besöker tandvården för undersökning	<ul style="list-style-type: none">• bedöma risken för sjukdomar och andra tillstånd i munnen, och utreda orsaker vid behov och• registrera erosioner (tandskador) med hjälp av ett erosionsindex	3

	Hela riket	Sydöstra	Tandläkare
Alltid/Ofta	66%	79%	80%

Systematisk registrering Smärta och funktionsstörningar

Id	Arbeta systematiskt för personer som ...	genom att ...	Prioritet
E35	<ul style="list-style-type: none">• är över 12 år och• besöker tandvården för undersökning	upptäcka smärta och funktionsstörningar i käkarna	3
E36	<ul style="list-style-type: none">• är över 12 år och• har smärta och funktionsstörningar i käkarna	ställa diagnos i systemet DC/TMD	3

Alltid/Ofta	Hela riket	Sydöstra	Jkpg	Kalmar	Östg
Barn >12år	67%	79%	59%	62%	86%
Vuxna	86%	84%			

Systematisk registrering Smärta och funktionsstörningar

Id	Arbeta systematiskt för personer som ...	genom att ...	Prioritet
E35	<ul style="list-style-type: none">• är över 12 år och• besöker tandvården för undersökning	upptäcka smärta och funktionsstörningar i käkarna	3
E36	<ul style="list-style-type: none">• är över 12 år och• har smärta och funktionsstörningar i käkarna	ställa diagnos i systemet DC/TMD	3

Alltid/Ofta	Hela riket	Sydöstra	Jkpg	Kalmar	Östg
Barn >12år	67%	79%	59%	62%	86%
Vuxna	86%	84%			

Viktigt att identifiera unga med TMD-smärta

AUTOREFERAT TMD-smärta är vanligt hos barn och ungdomar. De flesta blir bra utan större hjälpinsatser, men för en mindre grupp är besvären återkommande och långvariga. Det är viktigt att identifiera denna grupp av framför allt unga tonårsflickor och ge dem redskap att hantera sin situation.

Godkänt för publicering 15 augusti 2007



Ing-Marie Nilsson
leg tandläkare, Centrum
för oral rehabilitering,
Linköping
E-post: ing-marie.
nilsson@lio.se

Smärta i olika delar av kroppen – huvudvärk samt ont i mage, rygg, armar och ben – är vanligt hos barn och ungdomar. Longitudinella studier har kunnat fastställa att smärta i barndom och tidiga tonår associeras med smärta hos unga vuxna. Temporomandibulär dysfunktion (TMD) (smärt- och dysfunktionstillstånd lokaliserade till ansikte och käkar) är också vanligt hos barn och ungdomar. Tidigare epidemiologiska studier har i Sverige och utomlands visat att 2-7 procent av barn och ungdomar har smärta relaterad till käksystemet. Skillnaderna i förekomst kan bero på hur man ställt frågorna om smärta och vilket

ont i tinning, ansikte, käke, eller käkled en gång i veckan eller oftare?» och »Gör det ont när du gapar eller tuggar, en gång i veckan eller oftare?«. Om en eller båda frågorna besvaras med ja, registreras det i journalen som TMD-S=1. Besvaras frågorna med nej registreras TMD-S=0.

Avhandlingen omfattar fyra delarbeten där det övergripande syftet varit att studera tillförlitligheten av självrapporterad TMD-smärta hos ungdomar. Vidare var syftet att utvärdera prevalens (förekomst) och incidens (nyinsjuknande) av TMD-smärta, vilken behandling man får hos folktandvården samt vad smärtan får för konsekvenser för dem som drabbas.

Delarbete I

Det första delarbetets syfte var att utvärdera prevalens av TMD-smärta samt vilken behandling ungdomarna fått inom folktandvården. Det första året, år 2 000, registrerades 28 899 ungdomar och förekomsten av TMD-smärta var 4,2 procent. TMD-smärta var signifikant vanligare hos flickor (6 %) än hos pojkar (2,7 %) och ökade med stigande ålder (figur 1). En genomgång av 200 slumpvis utvalda journaler visade att 29 procent av ungdomar med TMD-smärta fick nå-

Avhandling
Ing Marie Nilsson,
FTV Östergötland

Screening frågor

Tandläkartidningen maj 2007

Riskbedömning och revisionsintervall

Rekommendationer till tandvården – intervall för basundersökning (revisionsintervall)

Id	Erbjud basundersökning till vuxna med ...	en gång per ...	Prioritet
37	låg risk för dålig munhälsa	2–3 år	3
109	hög risk för dålig munhälsa	1–1,5 år	3

Riskbedömning och revisionsintervall

Låg risk

Intervall	Hela landet	Sydöstra
Kortare än 12 mån	1%	0%
12-18 mån	13%	9%
19-23 mån	18%	12%
24-36 mån	62%	76%
Längre än 36 mån	6%	2%

Riskbedömning och revisionsintervall

Hög risk

Intervall	Hela landet	Sydöstra
Kortare än 12 mån	22%	13%
12-18 mån	74%	85%
19-23 mån	2%	1%
24-36 mån	2%	1%
Längre än 36 mån	0%	0%

Riskbedömning och revisionsintervall

Låg risk

Intervall	Offentlig hela landet	Privat hela landet
Kortare än 12 mån	1%	2%
12-18 mån	6%	57%
19-23 mån	18%	25%
24-36 mån	68%	14%
Längre än 36 mån	6%	1%

Riskbedömning och revisionsintervall

Hög risk

Intervall	Offentlig hela landet	Privat hela landet
Kortare än 12 mån	15%	71%
12-18 mån	80%	28%
19-23 mån	2%	1%
24-36 mån	2%	0%
Längre än 36 mån	1%	0%

Riskbedömning och revisionsintervall

- Riskbedömning görs och revisionsintervallen för patienter följer i stort sett rekommendationerna
- Tandvården i den sydöstra sjukvårdsregionen har något sämre tillgänglighet än landet i övrigt.
- I Kalmar har man något bättre tillgänglighet för patienter med hög risk för dålig munhälsa jämfört med Jönköping och Östergötland
- Privattandvården har bättre tillgänglighet än den offentliga tandvården

Smärtstillande

Hur ofta erbjuder du barn smärtstillande läkemedel inför en operation i munnen (exempelvis vid tanduttagning)?


Rekommendationer till tandvården – tandskador och smärtlindring vid behandling

Id	Behandla barn som ...	genom att ...	Prioritet
75	känner obehag vid behandlingar (procedursmärta), t.ex. vid tanduttagning	ge smärtstillande läkemedel före behandlingen (t.ex. paracetamol)	5

Smärtstillande

Hur ofta erbjuder du barn smärtstillande läkemedel inför en operation i munnen (exempelvis vid tanduttagning)?

Preoperativ smärtstillning




Molar Incisor Hypomineralization (MIH)

När du behandlar ett barn med en gravt mineraliserings-skadad första permanenta molar (MIH), hur ofta väljer du att extrahera tanden?

Rekommendationer till tandvården – tandskador och smärtlindring vid behandling

Id	Behandla barn som ...	genom att ...	Prioritet
28	<ul style="list-style-type: none">• är 6–11 år och• har en gravt mineraliserings-skadad första molar (tillståndet MIH)	ta bort den skadade tanden	2

Extraktion av första molar vid MIH



MIH

När du behandlar ett barn med en gravt mineraliserings-skadad första permanenta molar (MIH), hur ofta väljer du att extrahera tanden?

Föregås ditt beslut om extraktion av en konsultation med specialist inom pedodonti eller ortodonti?

Över 80% konsulterar pedodontist eller ortodontist före beslut om extraktion av skadad första molar.

Partiell pulpotomi


När du behandlar barn med en komplicerad kronfaktur, hur ofta utför du då partiell pulpotomi?

Rekommendationer till tandvården – tandskador och smärtlindring vid behandling

Id	Behandla barn som ...	genom att ...	Prioritet
74	har fått en yttre skada i en permanent framtand, som även skadat tandpulpan (pulpaexponering av permanent incisiv vid tandtrauma)	ta bort en del av tandpulpan (partiell pulpotomi)	2

Partiell pulpotomi

Partiell pulpotomi



När du behandlar vuxna patienter med symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon inte nått pulpan, hur ofta utför du då fullständig kariesexkavering?


Rekommendationer till tandvården – smärta och infektion i tandpulpan och tandroten

Id	Behandla symtomen hos vuxna med pulpit (inflammation i tandpulpan), om ...	genom att ...	Prioritet
D8.1	kariesskadans uppmjukningszon inte nått tandpulpan	<ul style="list-style-type: none">• ta bort karies (fullständig kariesexkavering) och• försegla tanden, inklusive den djupaste delen av kariesskadan, med temporär eller permanent fyllning	2

Bild: Kristian Havsed

Exkavering och överkappning

Fullständig exkavering



Exkavering och överkappning

Rekommendationer till tandvården – blottad tandpulpa

Id	Behandla vuxna med en tandpulpa som blottats genom ...	med ...	Prioritet
D1.1, D1.2, D1.4	friskt dentin	<ul style="list-style-type: none">pulpaöverkappning ellerpartiell pulpotomi	4
Id	Behandla <u>inte</u> vuxna med en tandpulpa som blottats genom ...	med ...	Prioritet
D1.3	friskt dentin	pulpaöverkappning med bondingmaterial som sårförband (ett fyllningsmaterial som binder till dentin)	icke-göra

När du utför överkappning på vuxen patient med exponerad pulpa via friskt dentin, hur ofta utför du behandling med följande material?





Bild: Dan Sebring

(A) Permanent fyllning.
(B) Sårförband
(C) På sikt bildas en hårdvävnadsbrygga i pulpan.

Bondingmaterial som sårförband vid överkappning



Symptomatisk apikal parodontit


När du behandlar en vuxen patient med symptomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd, hur ofta utför du då följande behandlingar?

Rekommendationer till tandvården – smärta och infektion i tandpulpan och tandroten

Id	Behandla symtomen hos vuxna med apikal parodontit (inflammation vid tandroten), om ...	genom att ...	Prioritet
D10.2	sjukdomen inte påverkar allmäntillståndet	rensa rotkanalssystemet fullständigt	2
D10.1		<ul style="list-style-type: none">• avlägsna den döda kronpulpan och• försegla tanden med temporär fyllning	4
Id	Undvik om möjligt att behandla symtomen hos vuxna med apikal parodontit (inflammation vid tandroten), om ...	genom att ...	Prioritet
D10.4	sjukdomen inte påverkar allmäntillståndet	ge systemisk behandling med antibiotika, som enda behandling	9
D10.3		ge systemisk behandling med antibiotika, som tillägg till fullständig rensning av rotkanalssystemet	10

Symptomatisk apikal parodontit

Sydöstra



Tilläggsbehandling vid förhöjd risk för kronkaries


Hur ofta erbjuder du följande tilläggsbehandlingar till vuxna med förhöjd risk för kronkaries?

Rekommendationer till tandvården
– främja munhälsan hos vuxna med risk för karies och tidig karies som riskerar att förvärras

Id	Främja munhälsan hos vuxna med ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
B3.10	förhöjd risk för kronkaries	fluoridlackning minst 2 gånger per år	3
B3.2, B3.3		<ul style="list-style-type: none">• 0,2-procentig NaF-lösning <i>eller</i>• fluoridgel i skena	4

Tilläggsbehandling vid förhöjd risk för kronkaries

Frekvens alltid/ofta användare



Tilläggsbehandling vid förhöjd risk för rotkaries


Hur ofta erbjuder du följande tilläggsbehandlingar till vuxna med förhöjd risk för rotkaries?

Rekommendationer till tandvården – främja munhälsan hos vuxna med risk för karies och tidig karies som riskerar att förvärras

Id	Främja munhälsan hos vuxna med ...	genom att erbjuda ...	Prioritet
B12.3, B12.4, B12.1, B12.11	förhöjd risk för rotkaries	<ul style="list-style-type: none">• 0,2-procentig NaF-lösning• fluoridgel i skena• tandkräm med 5 000 ppm NaF eller• fluoridlackning minst 2 gånger per år	3

Tilläggsbehandling vid förhöjd risk för rotkaries

Frekvens alltid/ofta användare



Har ni rutiner på kliniken för att upprätthålla tandvårdskontakt vid återbud och uteblivande för följande patienter?

Barn


Vuxna

Vuxna med behov av särskilt stöd


Rekommendationer till tandvården – främja munhälsan hos vuxna som behöver särskilt stöd

Id	Främja munhälsan hos vuxna som behöver särskilt stöd och ...	genom att ...	Prioritet
76	har förlorat eller riskerar att förlora en regelbunden tandvårdskontakt	arbeta systematiskt för att upprätthålla tandvårdskontakten vid återbud eller uteblivet besök	2


Barn



Personer som behöver särskilt stöd (exempelvis sköra, äldre patienter)



Vuxna



Som avslutning i gap-analysen utifrån enkätundersökningen



En kavalkad av högt prioriterade rekommendationer i riktlinjerna där vi uppfyller god följsamhet

- Tell-Show-Do för inskolning av barn
- Riskbedömning systematiskt arbetssätt
- Hörntänder eruptionsstörningar
- Parodontal behandling