

RAG neo SÖSR

Cecilia Kåremyr,
Barnläkare i Västervik

RAG neo

- 2 -4 representanter per enhet
- Ordförandeskap som roterar
- 4 möten fördelade över året
 - 2 digitala
 - 2 möten där vi ses, varav ett sambokat med årets regiondag
- Värdefullt forum för att lätt lyfta frågor
- Regiondag neonatologi

RAG neo

- Årlig RAG-rapport med regional neostatistik från SNQ
- Olika fokusområden utifrån vad vi behöver jobba med i regionen (nya riktlinjer, når ej målvärden, skillnad mellan kliniker)

Best practice - följer vi de riktlinjer som finns?

Sammanställs och presenteras på regiondagen

- Tema regiondag

Best practice


Tidigare genomgångar

- Ikterus (bilirubin > 425)
- Prenatala steroider vid hotande förtidsbörd
- Kylbehandling vid HIE grad 2-3 eller kramper
- Surfaktant vid IRDS
- Amningsresor


Regiondagar

- Ikterus
- Asfyxi - kylbehandling
- SALSA
- Amning - bröstmjölakens betydelse

Antal födda i SÖR 2020 - 2024




Andel barn per 1000 levande födda med bilirubin > 425



Det har talats om nolltolerans, men föreslaget **målvärde** i årsrapporten 2023 är riksgenomsnittet på **0,9 per 1000 levande födda barn**. Målvärdet har tidigare varit < 0,25.

Andel barn med glukos < 1,5
per 1000 levande födda



Ett särskilt uttalat mål är att helst undvika helt, snabbt upptäcka och effektivt behandla blodsockervärden under 1,5 mmol/L. Svår hypoglykemi kan orsaka bestående hjärnskada.

Sveriges genomsnitt, andel barn med p-glukos < 1,5 efter 3 timmars ålder per 1000 födda: 5,6

RAG neo - årets tema

- Best practice hypoglykemi

10 barn med p-glc < 1,5

Fanns det riskfaktorer?

Ålder, symtom

Behandling och glukoskontroll
enligt PM?

Slutsatser

Flera riskfaktorer samverkar

Alla neobarn är riskbarn

Tid till tidig tillmatning

Matmängder vid behandling

Om ingen tydlig riskfaktorer och allvarlig hypoglykemi, utred för bakomliggande orsak

Hur registrerar vi?

Skilnad mellan enheter förklaras delvis
av olika rutiner

Regiondag

Tema: Nollseparation

Jönköping i november

Best practice presentation

Föreläsare neonatolog +
barnsjuksköterska

Kort presentation från alla enheter
– hur gör vi?

Diskussion i yrkesgrupper

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Initial obruten hud mot hudkontakt och samvård

Gäller alla nyfödda barn och deras mödrar under första timmarna och tiden då båda vårdas på sjukhus

Hud mot hud direkt efter födseln (minst 2 timmar)
från graviditetsvecka 28

Samvård = två personer vårdas tillsammans (nära eller på samma enhet)

oavsett vårdnivå

Mer samarbete över klinikgränser (neo, förlossning/BB, narkos, operation)